

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab September 2007

Informationsstand September 2007

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostensparnis € pro Packung*
A04 ANTIEMETIKA UND MITTEL GEGEN ÜBELKEIT					
A04AA02 Granisetron					
Granisetron „Stada“ 2 mg Filmtabl.	5 Stk.	-		47,55	38,75
<i>IND: Zusatzbehandlung bei Chemo- oder Radiotherapie</i>					
<p>Nach über einem Jahrzehnt der Verfügbarkeit ist Granisetron nunmehr nach Ondansetron die zweite Substanz aus der Gruppe der 5HT3-Antagonisten, die auch generisch verfügbar ist. Die Substanzklasse wird in der medizinisch wissenschaftlichen Literatur als vergleichbar beurteilt (1,2). Die generische Verfügbarkeit hat zur Folge, dass die Substanzklasse von einem enormen Preis- und Kostenunterschied geprägt ist. Nachdem zehn Jahre lang auf einem einheitlichen Preisniveau angeboten wurde, sind die Preise für Kytril, Navoban zT mehr als doppelt so hoch als für Ondansetron und Granisetron Stada.</p> <p>1 Treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting with 5-hydroxytryptamine type 3 receptor antagonists Dtsch Med Wochenschr. 2006 Dec 1;131(48):2707-12</p> <p>2 Antiemetika Pharmainformation Jahrgang 18/Nr.1, März 2003</p>					
J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J01FA09 Clarithromycin					
Clarithromycin „Ranbaxy“ 250 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	7,50	0,20
500 mg Filmtabl.	10 Stk.		(2)	7,95	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	14 Stk.	T2	-	8,30	13,70
J01FF01 Clindamycin					
Clindamycin „Alternova“ 150 mg Kaps.	16 Stk.	-	-	6,75	2,35
300 mg Kaps.	16 Stk.		-	11,00	1,35
	24 Stk.	-	-	14,65	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
M01 ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA					
M01AC06 Meloxicam					
Meloxicam „G.L.“ 7,5 mg Tabl.	10 Stk.		(2)	1,35	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	T2	-	4,35	1,00

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: September 2007)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
15 mg Tabl.	10 Stk.	T2	(2)	1,70	0,45
	30 Stk.		-	5,40	0,55

Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
G04 UROLOGIKA				
G04BD07 Tolterodin				
Detrusitol 1 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	9,20
	56 Stk.		-	-
2 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	9,20
	56 Stk.		-	-
P03 MITTEL GEGEN EKTOPARASITEN, INKL. ANTISCABIOSA, INSEKTIZIDE				
P03AC04 Permethrin				
Infectoscab 5 % Creme	30 g	-	-	14,80
S01 OPHTHALMIKA				
S01ED51 Timolol, Kombinationen				
Combigan Augentropf.	5 ml	-	(2)	15,40

ROT → **GELB**

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
G03 SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS				
G03GA04 Urofollitropin				
RE1 Fostimon 75 IU/1 ml Plv. u. Lösungsmittel z. Herst. einer Inj.lsg.	1 Stk.	-	-	28,60
	10 Stk.		-	-
Bei anovulatorischen Frauen zur Auslösung der Ovulation, die auf eine Behandlung mit Clomifencitrat nicht ansprechen. Nicht zur Unterstützung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion.				
J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG				
J05AE10 Darunavir				
RE1 Prezista 300 mg Filmtabl.	120 Stk.	-	-	710,40

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
In Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir und anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei mehrfach vorbehandelten HIV-1-infizierten Erwachsenen, bei denen es unter mehr als einem Behandlungsschema mit einem Proteasehemmer zu einem Therapieversagen gekommen ist. Die Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen sind von einem Arzt, der Erfahrung in der Behandlung der HIV-Infektion besitzt, durchzuführen.					
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06AX Andere Antidepressiva					
RE1	Wellbutrin XR 150 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	-	27,60
RE1	300 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	-	44,70
Zur Behandlung der Depression, wenn mit Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich nachweislich nicht das Auslangen gefunden werden kann.					
Ein klinisch relevanter Vorteil (objektiviert mittels Depressionsskala) gegenüber den Antidepressiva im Grünen Bereich ist nicht belegt					
N06BA04 Methylphenidat					
RE1 SG	Concerta 54 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	-	80,05
Bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms, wenn mit Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich (ATC-Code N06BA04) kein Auslangen gefunden werden kann. Diagnosestellung, Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrolle durch einen Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Pädiatrie. Concerta eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitgenehmigung für 3 Monate (L3).					
N06BA09 Atomoxetin					
RE1	Strattera 10 mg Hartkaps.	7 Stk. 28 Stk.	-	-	28,60 104,60
	18 mg Hartkaps.	7 Stk. 28 Stk.	-	-	28,60 104,60
	25 mg Hartkaps.	7 Stk. 28 Stk.	-	-	28,60 104,60
	40 mg Hartkaps.	7 Stk. 28 Stk.	-	-	28,60 104,60
	60 mg Hartkaps.	28 Stk.	-	-	104,60
Bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms, <ul style="list-style-type: none"> - wenn der Einsatz von Stimulantien (ATC-Code N06BA04) nicht angezeigt ist, - wenn Hinweise auf einen Substanzmissbrauch bestehen oder ein solcher bestand, - bei Patienten mit komorbider Tic- oder Angststörung. Diagnosestellung, Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrolle durch einen Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Pädiatrie. Strattera eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitgenehmigung für 3 Monate (L3).					
Die medikamentöse Therapie des ADHS ist immer von nichtmedikamentösen Maßnahmen begleitet und Teil eines umfassenden Therapiekonzeptes, welches das betroffene Kind, die Eltern und die Lehrer inkludiert und auf die Therapieführung und –kontrolle fokussiert. In klinischen Studien wurden im Vergleich zu Placebo vermehrt suizidale Verhaltensweisen und feindseliges Verhalten beobachtet (1).					
1 http://www.arznei-telegramm.de/abo/b050930.php3?&knr=103178/361397					

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Bricanyl 1% Inhalationskonzent.	20 ml	R03AC03	03.08.2007
Nolvadex 10 mg Filmtabl.	30 Stk	L02BA01	03.08.2007
Nolvadex 30 mg Filmtabl.	30 Stk	L02BA01	17.08.2007
Ranitidin "Ratiopharm" 150mg lösl.Tabl.	20 Stk 50 Stk	A02BA02	03.08.2007
Ranitidin "Ratiopharm" 300mg lösl.Tabl.	10 Stk 30 Stk	A02BA02	03.08.2007
Venotop Dragees	30 Stk	C05CA54	03.08.2007
Clamoxyl 500mg Kaps.	12 Stk 30 Stk	J01CA04	09.08.2007
Clamoxyl 200mg/4 ml Trockensaft	80 ml	J01CA04	09.08.2007

Änderung der Verschreibbarkeit im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
C07 BETA-ADRENOREZEPTOR-ANTAGONISTEN				
C07AB02 Metoprolol				
Methohexal retard 47,5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	0,80
	30 Stk.	-	(2)	1,95
95 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	1,30
	30 Stk.	-	(2)	3,25
Metoprololsuccinat "1 A Pharma" retard 47,5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	0,80
	30 Stk.	-	(2)	1,95
95 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	1,30
	30 Stk.	-	(2)	3,25
Ab 01.09.07 ist auch die 30 St Packung 2 mal frei verschreibbar.				

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
H01 HYPOPHYSEN- UND HYPOTHALAMUSHORMONE UND ANALOGA				
H01BA02 Desmopressin				
RE2 Minirin Melt 60 mcg Lyophilisat zum Einnehmen	30 Stk.	-	-	32,90
	100 Stk.	-	-	89,00
RE2 120 mcg Lyophilisat zum Einnehmen	30 Stk.	-	-	55,60
	100 Stk.	-	-	162,40
Enuresis nocturna ab dem vollendeten 5. Lebensjahr, nach Abklärung und Erstverordnung durch einen Facharzt für Kinderheilkunde oder einen Facharzt für Urologie, strikte Einhaltung der einmaligen Medikation am Abend. In der Indikation Diabetes Insipidus keine Kostenübernahme, da der gleiche Wirkstoff zur nasalen Anwendung zu einem günstigeren Preis zur Verfügung steht, ausgenommen in Einzelfällen – wenn eine nasale Anwendung nicht möglich ist (pathologischer Nasenbefund). Bei Nykturie ist ein klinisch relevanter Patientennutzen durch die derzeitige Datenlage nicht ausreichend belegt; darüber hinaus kann Desmopressin zu Veränderungen im Serum-Na-Spiegel führen.				

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN					
M05BA06 Ibandronsäure					
RE1	Bonviva 3 mg Inj.lsg. i. e. Fertigspritze	1 Stk.	-	-	123,00
Langzeitbehandlung der Osteoporose (Knochendichte liegt mehr als 2,5 Standardabweichungen unter dem Durchschnittswert junger Erwachsener oder nach osteoporotischer Fraktur), wenn orale Bisphosphonate (ATC-Code M05BA, welche zur Therapie der Osteoporose zugelassen sind) nicht verwendet werden können.					
Ungeachtet der Vereinfachung der Verschreibbarkeit durch die Regeländerung bleibt Bonviva sowohl aus ökonomischer als auch aus medizinischer Sicht Mittel der 2. Wahl. Für Alendronsäure gibt es bessere Frakturdaten und es liegen bereits Langzeitdaten vor (1).					
(1) Effects of continuing or stopping alendronate after 5 years of treatment: the Fracture Intervention Trial Long-term Extension (FLEX): a randomized trial. JAMA. 2006 Dec 27;296(24):2927-38.					
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06BA04 Methylphenidat					
RE1 SG	Concerta 18 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	-	58,50
RE1 SG	36 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	-	76,45
Bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms, wenn mit Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich (ATC-Code N06BA04) kein Auslangen gefunden werden kann. Diagnosestellung, Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrolle durch einen Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Pädiatrie. Concerta eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitgenehmigung für 3 Monate (L3).					
Die medikamentöse Therapie des ADHS kann nur Teil eines umfangreichen (nichtmedikamentösen) Behandlungsprogrammes sein und ist keinesfalls bei allen Kindern notwendig.					
Sorgfältige Indikationsstellung und Therapiekontrolle sind obligat.					
Retardiertes und nicht retardiertes Methylphenidat entfalten in äquivalenten Dosen gegenüber Placebo eine ähnliche Wirkung. Der Einsatz von retardiertem Methylphenidat ist daher eingeschränkt auf Patienten, bei denen mit nichtretardiertem Methylphenidat nicht das Auslangen gefunden wird.					

Änderung der Verschreibbarkeit im Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06DA04 Galantamin					
RE2	Reminyl retard 8 mg Kaps.	7 Stk.	-	-	18,65
		28 Stk.	-	(2)	66,70
RE2	16 mg Kaps.	28 Stk.	-	(2)	93,80
RE2	24 mg Kaps.	28 Stk.	-	(2)	102,90
Die 28 St Packungen sind mit 01.09.07 2 mal verschreibbar					
RE2	4 mg/ml Lösung	100 ml	-	(2)	72,60
Die 100ml Packung ist mit 01.09.07 2 mal verschreibbar					

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge		OP	KVP €
N03 ANTIPILEPTIKA				
N03AG01 Valproinsäure				
Convulex 300mg/ml Lsg. z. Einnehmen <i>(vormals Convulex 300mg/ml Tropf.)</i>	100 ml		2	