

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Juni 2012

Informationsstand Juni 2012

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
N03 ANTIPILEPTIKA					
N03AX14 Levetiracetam					
Levebon 100 mg/ml Lsg. zum Einnehmen	300 ml	-	-	27,00	33,90 (Erstanbieter in RE2)
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie					
Levetiracetam "Genericon" 500 mg Filmtabl.	60 Stk.	T2	-	26,65	33,10 (Erstanbieter in RE2)
1000 mg Filmtabl.	60 Stk.	T2	-	47,60	57,95 (Erstanbieter in RE2)
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie					
Levetiracetam "Stada" 500 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	14,30	22,20 (Erstanbieter in RE2)
	60 Stk.	T2	-	26,65	33,10 (Erstanbieter in RE2)
1000 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	26,65	33,10 (Erstanbieter in RE2)
	60 Stk.	-	-	47,60	57,95 (Erstanbieter in RE2)
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie					
Mit der Aufnahme von Levetiracetam Genericon und Levetiracetam Stada sind vier Nachfolgepräparate im Grünen Bereich. Mit Hinweis auf die breite Palette an Wirkstoffstärken, die unterschiedlichen Darreichungsformen der Nachfolgepräparate und den Preisvorteil sollte es nachvollziehbar sein, dass die Generika zu bevorzugen sind.					
R06 ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
R06AX27 Desloratadin					
Desloratadin "Actavis" 5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	2,15	2,75
	30 Stk.	-	-	5,20	6,30
Desloratadine "ratiopharm" 5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	2,15	2,75
	30 Stk.	-	-	5,20	6,30

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: Juni 2012)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Mit Desloratadin Actavis, Desloratadine Ratiopharm und Dasselta (Aufnahme in den EKO mit Mai) stehen drei kostengünstige Nachfolgepräparate zu Aerius zur ökonomischen Verschreibweise zur Verfügung.					
S01 OPHTHALMIKA					
S01ED51 Timolol, Kombinationen					
Dorzoratio comp. 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropf.	5 ml	-	(2)	6,35	9,05
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde					
Latanoprost/Timolol "Stada" 50 mcg/ml + 5 mg/ml Augentropf.	2,5 ml	-	(2)	13,20	11,40
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde					
Latanoratio comp 50 mcg/ml + 5 mg/ml Augentropf.	2,5 ml	-	(2)	13,20	11,40
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde					
S01EE01 Latanoprost					
Latanoprost "Stada" 50 mcg/ml Augentropf.	2,5 ml	-	(2)	10,50	12,60
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde					
Latanoratio 50 mcg/ml Augentropf.	2,5 ml	-	(2)	10,50	12,60
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde					
Mit der breiten generischen Verfügbarkeit von Latanoprost als Mono- und als Kombinationspräparat können die Augenärzte und -ärztinnen die Anliegen der Heilmittelökonomie mit einem signifikanten Beitrag unterstützen. Der Preisvorteil der Nachfolgepräparate ist klar ersichtlich.					

Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A07 ANTIDIARRHOIKA UND INTESTINALE ANTIPHLOGISTIKA/ANTIINFEKTIVA				
A07EA06 Budesonid				
Budo-San Uno 9 mg magensaftresistentes Gran.	30 Stk.	-	-	92,65
Hinweis: Kollagene Colitis				
Das Anwendungsgebiet dieses Cortisonpräparats ist die Induktion der Remission bei Patientinnen und Patienten mit akuter kollagener Colitis. Die Dauer der Behandlung sollte auf 8 Wochen begrenzt werden, ein abrupter Abbruch ist zu vermeiden.				
N06 PSYCHOANALEPTIKA				
N06AB03 Fluoxetin				
Mutan 60 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	9,45
	28 Stk.	T2	-	13,40
Die Wirkstärke von 60 mg entspricht der empfohlenen Höchstdosis für diese Substanz (http://www.basg.gv.at/uploads/media/120112-Fluoxetin.PDF , Zugang am 9.5.2012). Die Filmtabletten mit Bruchkerbe auf beiden Seiten können bei Bedarf in gleiche Hälften geteilt werden.				

ROT → **GELB**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
N06 PSYCHOANALEPTIKA						
N06DA02 Donepezil						
RE2	Donepezil "Pfizer" 5 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	18,20	17,90
L6		28 Stk.	-	-	35,00	59,75
RE2	10 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	56,65	46,10
L6						
<ul style="list-style-type: none"> - Die Diagnose DAT (Demenz vom Alzheimerstyp) ist von einem Facharzt/einer Fachärztin für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie oder Psychiatrie zu stellen. - Zu Therapiebeginn muss das Ergebnis der MMSE (Mini-Mental State Examination) größer bzw. gleich 10 betragen. - Vergewisserung für das Vorhandensein einer Betreuungsperson zur Sicherung der Compliance. - Eine Kontrolluntersuchung durch den/die o.a. Facharzt/Fachärztin ist nach Erreichung der Erhaltungsdosis durchzuführen. - Die Behandlung ist nur bei Ansprechen auf die Therapie weiterzuführen. - Alle 6 Monate ist eine Kontrolluntersuchung durch den/die o.a. Facharzt/Fachärztin mittels einer MMSE durchzuführen. - Die Behandlung mit Donepezil ist zu beenden, wenn das Ergebnis der MMSE kleiner 10 ist. - Donepezil darf nicht mit anderen Arzneimitteln gegen Demenz kombiniert werden. - Donepezil eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6). <p>Donepezil Pfizer ist das erste Nachfolgepräparat von Aricept, das ebenfalls von Pfizer angeboten wird. Die beiden Präparate haben verschiedene Überkartons und einen Preisunterschied von etwa 50 %. Welches werden Sie künftig rezeptieren? Weitere Donepezil-Nachfolgepräparate sind bereits zugelassen.</p>						

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL					
B01AX06 Rivaroxaban					
RE1 L6	Xarelto 15 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	45,55
		28 Stk.	-	-	85,95
		42 Stk.	-	-	123,70
RE1 L6	20 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	45,55
		28 Stk.	-	-	85,95

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
<ul style="list-style-type: none"> Zur Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie bei erwachsenen PatientInnen mit nicht valvulärem Vorhofflimmern mit einem oder mehreren der folgenden Risikofaktoren: <ul style="list-style-type: none"> - Vorausgegangener Schlaganfall, transitorische ischämische Attacke oder systemische Embolie - Linksventrikuläre Ejektionsfraktion kleiner 40 % - Symptomatische Herzinsuffizienz größer gleich New York Heart Association (NYHA) Klasse 2 - Alter ab 75 Jahre - Alter ab 65 Jahre einhergehend mit einer der folgenden Erkrankungen: Diabetes mellitus, koronare Herzerkrankung oder arterielle Hypertonie Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) sowie Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien (LE) nach akuten TVT bei Erwachsenen. Xarelto eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6). 					
J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J05AG04 Etravirin					
RE2	Intelence 200 mg Tabl.	60 Stk.	-	-	456,70
<p>In Kombination mit einem geboosterten Protease-Inhibitor (PI) und anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei mehrfach vorbehandelten HIV-1-infizierten Erwachsenen, die eine Vorbehandlung mit einem NNRTI aufweisen.</p> <p>Die Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen sind von einem Arzt/einer Ärztin, der/die Erfahrung in der Behandlung der HIV-Infektion besitzt, durchzuführen.</p>					

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Betacarpin Augentropf.	10 ml	S01ED54	26.04.2012
Cetirizindihydrochlorid "Arcana" 10 mg Filmtabl.	10 Stk. 30 Stk.	R06AE07	01.06.2012
Clotrimazol "Genericon" 1 % Salbe	30 g	D01AC01	01.06.2012
Enbrel 25 mg/ml Plv. u. Lsgm. z. Herst. einer Inj.lsg. z. Anw. bei Kindern u. Jugendlichen	4 Stk.	L04AB01	01.06.2012
Insuman Infusat 100 IE/ml Injektionslsg. in einer Patrone z. Verwendung in Pumpen	5 Stk.	A10AB01	01.06.2012
Molsidolat 2 mg Tabl.	20 Stk. 50 Stk.	C01DX12	01.06.2012
Myambutol 400 mg Filmtabl.	100 Stk.	J04AK02	01.06.2012
Ondansetron "Arcana" 4 mg Filmtabl.	10 Stk.	A04AA01	01.06.2012
Oxcarbazepin "Arcana" 300 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AF02	01.06.2012
Paroxetin "Pfizer" 20 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB05	01.06.2012
Permax 1 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N04BC02	31.05.2012
Schwefelbad Dr. Klopfer	12 Stk.	D11AX	01.06.2012
Timoftal 0,25 % Augentropf.	5 ml	S01ED01	01.06.2012
Topiramat "G.L." 25 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.06.2012
Topiramat "G.L." 50 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.06.2012

Topiramat "G.L." 100 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.06.2012
Topiramat "G.L." 200 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.06.2012

Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
G04 UROLOGIKA				
G04BD07 Tolterodin				
Detrusitol 1 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	-	12,50
	56 Stk.	-	-	24,25
2 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	-	12,50
	56 Stk.	-	-	24,25
Änderung der Kleinpackung von 20 Stk. auf 28 Stk. Die 56 Stk.-Pkg. bleibt unverändert.				

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG				
J01CR02 Amoxicillin und Enzym-Inhibitoren				
Amoclanhexal 1 g (875 mg/125 mg) Filmtabl. <i>vormals Amoclanhexal 1 g Filmtabl.</i>	10 Stk.	-	(2)	8,70
	14 Stk.	-	-	10,30
Amoxiclavulan "1A Pharma" 1 g (875 mg/125 mg) Filmtabl. <i>vormals Amoxiclavulan "1A Pharma" 1 g Filmtabl.</i>	10 Stk.	-	(2)	8,70
	14 Stk..	-	-	10,30

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
N06 PSYCHOANALEPTIKA				
N06DA04 Galantamin				
RE2 L6 Reminyl retard 8 mg Kaps.	7 Stk.	-	-	13,50
	28 Stk.	-	(2)	46,70
RE2 L6 16 mg Kaps.	28 Stk.	-	(2)	69,55
RE2 L6 24 mg Kaps.	28 Stk.	-	(2)	76,05

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<ul style="list-style-type: none"> - Die Diagnose DAT (Demenz vom Alzheimerstyp) ist von einem Facharzt/einer Fachärztin für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie oder Psychiatrie zu stellen. - Zu Therapiebeginn muss das Ergebnis der MMSE (Mini-Mental State Examination) größer bzw. gleich 10 betragen. - Vergewisserung für das Vorhandensein einer Betreuungsperson zur Sicherung der Compliance. - Eine Kontrolluntersuchung durch den/die o.a. Facharzt/Fachärztin ist nach Erreichung der Erhaltungsdosis durchzuführen. - Die Behandlung ist nur bei Ansprechen auf die Therapie weiterzuführen. - Alle 6 Monate ist eine Kontrolluntersuchung durch den/die o.a. Facharzt/Fachärztin mittels einer MMSE durchzuführen. - Die Behandlung mit Galantamin ist zu beenden, wenn das Ergebnis der MMSE kleiner 10 ist. - Galantamin darf nicht mit anderen Arzneimitteln gegen Demenz kombiniert werden. - Galantamin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6). 				
Änderung beim MMSE von 12 auf 10.				

Änderung der Packungsgröße im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
B02 ANTIHÄMORRHAGIKA					
B02BD02 Gerinnungsfaktor VIII					
RE1	ReFacto AF 500 IE Plv. u. Lsgm. z. Herst. einer Inj.lsg. in einer Fertigspr.	1 Stk.	-	-	396,90
RE1	1000 IE Plv. u. Lsgm. z. Herst. einer Inj.lsg. in einer Fertigspr.	1 Stk.	-	-	769,10
Bei angeborenem Faktor VIII Mangel (Hämophilie A). Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. –ambulanz.					
Austausch der Packungsform = Fertigspritze anstatt bisher Pulver und Lösungsmittel					