


Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab April 2008

Informationsstand April 2008

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
C08 CALCIUMKANALBLOCKER					
C08CA01 Amlodipin					
Amlodipin „1A Pharma“ 7,5 mg Tabl.	10 Stk.		(2)	2,75	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	-	(2)	8,25	
Amlodipin „Sandoz“ 7,5 mg Tabl.	10 Stk.		(2)	2,75	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	-	(2)	8,25	
Amlodipin ist nun erstmals auch in der 7,5 mg Wirkstoffstärke verfügbar und bietet damit eine zusätzliche Möglichkeit zur individuelleren Dosierung. Unverändert haben die Amlodipin-Geneika einen Preisvorteil von bis zu 4,65 € in der Wirkstoffstärke zu 5 mg.					
C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN					
C10AA01 Simvastatin					
Simvastatin „Bayer“ 20 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	(2)	12,65	10,35
40 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	(2)	12,65	55,80 (Erstanbieter nicht im EKO)
Simvastatin Bayer (zu 20 mg und 40 mg im EKO) ist das erste Statin ohne IND-Regelung und das zum günstigsten Preis aller Statine. Somit ist es auch für – von der IND-Regel nicht umfasste - Hochrisikopatienten kassenfrei im Grünen Bereich verordenbar					
L02 ENDOKRINE THERAPIE					
L02BB03 Bicalutamid					
Androbloc 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	76,80	80,05
150 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	153,00	218,00
Trotz Preissenkung des Erstanbieters im Jänner besteht nach wie vor ein Preisunterschied von über 50 %.					
Für Bicalutamid in der Wirkstoffstärke 150 mg ist entsprechend der vor kurzem geänderten Fachinformation die Anwendung bei lokal fortgeschrittenem Prostatakarzinom nunmehr auf Patienten mit hohem Progressionsrisiko beschränkt. Diese Änderung des Anwendungsgebietes beruht auf der Erkenntnis, dass eine Verminderung des Risikos einer objektiven Progression der Erkrankung bei den Patientengruppen mit dem höchsten Progressionsrisiko am deutlichsten war.					
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06A  Paroxetin					

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierunsgäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: April 2008)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Ennos 20 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	8,45	2,15
	28 Stk.		-	14,70	3,65
N06AX11 Mirtazapin					
Mirtazapin „G.L.“ 30 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	10,30	38,75 (Erstanbieter nicht im EKO)
45 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	11,05	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden

ROT → **GELB**

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A10 ANTIDIABETIKA				
A10AE05 Insulin detemir				
RE1 Levemir 100 E/ml Inj. lsg. in einem Injektor vorgefüllt, FlexPen	5 Stk.	-	-	74,25
Für PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 1, wenn mit Insulinen aus dem Grünen Bereich (A10AC) aufgrund von symptomatischen, wiederkehrenden nächtlichen Hypoglykämien eine ausreichende Therapieeinstellung nicht möglich ist. Levemir eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6). Levemir ist leicht handhabbar und Dosierungen sind mit Hilfe des Dosierknopfes leicht einstellbar und ohne Insulinverlust korrigierbar.				

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL				
B01AX05 Fondaparinux				
RE1 Arixtra 2,5 mg/0,5 ml Inj. lsg. Fertigspr.	10 Stk.	-	-	60,55
Zur Prophylaxe venöser thromboembolischer Ereignisse (VTE) bei Patienten, die sich größeren orthopädischen Eingriffen an den unteren Extremitäten unterziehen müssen, wie beispielsweise Hüftfrakturen, Knie- oder Hüftersatzoperationen.				
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN				
M05BA08 Zoledronsäure				
RE2 Aclasta 5 mg Inf. lsg.	1 Stk.	-	-	380,00
Langzeitbehandlung der Osteoporose (Knochendichte liegt mehr als 2,5 Standardabweichungen unter dem Durchschnittswert junger Erwachsener oder nach osteoporotischer Fraktur) für maximal drei Jahre, wenn orale Bisphosphonate (ATC-Code M05BA, welche zur Therapie der Osteoporose zugelassen sind) nicht verwendet werden können. Bei M. Paget des Skeletts: Erstverordnung und Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung. Entsprechend der Fachinformation hat Aclasta die Zulassung für die postmenopauselle Osteoporose. Die Verabreichung erfolgt einmal pro Jahr. Die Basistherapie mit Calcium und Vit. D ist nach wie vor unerlässlich.				

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
N07 ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM					
N07BC Mittel zur Behandlung der Opiatabhängigkeit					
RE1 SG	Compensan retard 100 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	-	13,85
		30 Stk.	-	-	34,60
RE1 SG	200 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	-	28,55
		30 Stk.	-	-	73,95
RE1 SG	300 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	-	38,40
		30 Stk.	-	-	94,10
Zur Substitutionsbehandlung, wenn Mittel der 1. Wahl gemäß § 23c der Suchtgiftverordnung bei nachvollziehbarer und objektivierbarer Unverträglichkeit oder bei Auftreten von nicht tolerierbaren Nebenwirkungen nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, wobei gemäß den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen Methadon der Vorzug zu geben ist.					
RE1 SG	Substitol retard 120 mg Kaps.	10 Stk.	-	-	20,40
		30 Stk.	-	-	52,00
RE1 SG	200 mg Kaps.	10 Stk.	-	-	28,55
		30 Stk.	-	-	73,95
Zur Substitutionsbehandlung, wenn Mittel der 1. Wahl gemäß § 23c der Suchtgiftverordnung bei nachvollziehbarer und objektivierbarer Unverträglichkeit oder bei Auftreten von nicht tolerierbaren Nebenwirkungen nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, wobei gemäß den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen Methadon der Vorzug zu geben ist.					

Folgende Präparate wurden aus dem Grünen und Gelben Bereich des EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Acetonal Haemorrhoidal Salbe	20 g	C05AX03	22.02.2008
Acromax Nasenspray	20 ml	R01AC01	01.04.2008
Akrinor Filmtabl.	50 Stk.	C01CA30	01.04.2008
Amphodyn retard Kaps.	20 Stk. 50 Stk.	C01CA51	01.04.2008
Ampho-Moronal Creme	10 g	D01AA	01.04.2008
Augmentin 312,5 mg/5 ml Trockensaft	60 ml 120 ml	J01CR02	01.04.2008
Beloc Duriles 200 mg retard Filmtabl.	20 Stk. 50 Stk.	C07AB02	27.02.2008
Clav amox 156,25 mg/5 ml Trockensaft	60 ml 120 ml	J01CR02	01.04.2008
Clav amox 312,5 mg/5 ml Trockensaft	60 ml 120 ml	J01CR02	01.04.2008
Codipront Retard Kaps.	10 Stk.	R05DA20	01.04.2008
Codipront Retard Saft	90 ml	R05DA20	01.04.2008
Dilzem 60 mg Tabl.	20 Stk. 50 Stk.	C08DB01	22.02.2008
Dilzem retard 90 mg Filmtabl.	20 Stk. 50 Stk.	C08DB01	22.02.2008
Epanutin Kaps.	100 Stk.	N03AB02	01.04.2008

Erypo 1.000 IE/0,5 ml Stechamp.	6 Stk.	B03AX01	01.04.2008
Erypo 10.000 IE/1 ml Stechamp.	6 Stk.	B03XA01	01.04.2008
Esucos 25 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N05AB01	13.03.2008
Fluocalcic Brausetabl.	60 Stk.	A12CD51	01.04.2008
Haemodyn 400 mg Kaps.	20 Stk. 50 Stk.	C04AD03	01.04.2008
Haemodyn 600 mg Kaps.	20 Stk. 50 Stk.	C04AD03	01.04.2008
Hydoftal 0,5 % sine neomycino Augentropf.	5 ml	S01BA02	01.04.2008
Imagopaque 300 mg J/ml parenterale Röntgenkontrastmittellsg.	1 Stk. (75 ml) 1 Stk. (100 ml)	V08AB08	01.04.2008
Imagopaque 300 mg J/ml parenterale Röntgenkontrastmittellsg.	1 Stk. (50 ml) 1 Stk. (20 ml)	V08AB08	01.04.2008
Imagopaque 350 mg J/ml parenterale Röntgenkontrastmittellsg.	1 Stk. (50 ml)	V08AB08	01.04.2008
Indo-Agepha 50 mg Tabl.	20 Stk. 50 Stk.	M01AB01	01.04.2008
Isomack retard 20 mg Kaps.	20 Stk. 60 Stk.	C01DA08	01.04.2008
Konakion „Roche“ Kaudrag.	10 Stk.	B02BA01	01.04.2008
Leukase Puder	50 g	D06AX	01.04.2008
Mistabron Amp. z. Inhalation	6 Stk.	R05CB05	13.03.2008
Neulasta 6 mg Inj. lsg. in einem vorgefüllten Injektor	1 Stk.	L03AA13	01.04.2008
Nitro-Dur 5 mg/24 h Depot-Pflaster	30 Stk.	C01DA02	01.04.2008
Nitro-Dur 10 mg/24 h Depot-Pflaster	30 Stk.	C01DA02	01.04.2008
Novadral retard Drag.	50 Stk.	C01CA05	01.04.2008
Novadral Tropf.	50 ml	C01CA05	01.04.2008
Oleomycetin 1 % Augentropf.	5 ml	S01AA01	01.04.2008
Oleomycetin-Prednison Augentropf.	5 ml	S01CA02	01.04.2008
Reminyl 4 mg Filmtabl.	14 Stk. 56 Stk.	N06DA04	01.04.2008
Reminyl 8 mg Filmtabl.	56 Stk.	N06DA04	01.04.2008
Reminyl 12 mg Filmtabl.	56 Stk.	N06DA04	01.04.2008
Rhinaaxia Nasenspray	26 ml	R01AC05	01.04.2008
Rhinopront Kaps.	10 Stk.	R01BA53	01.04.2008
Sermion 30 mg lösl. Tabl.	30 Stk.	C04AE02	01.04.2008
Sinequan 50 mg Kaps.	30 Stk. 100 Stk.	N06AA12	01.04.2008
Sirup Famel c. Ephedrin	210 g	R05CA10	22.02.2008
Tepilta Susp.	175 ml	A02AX	01.04.2008
Thiloadren Augentropf.	5 ml	S01EB51	01.04.2008
Timophtal 0,25 % sine Einmal-Augentropf.	30 Stk.	S01ED01	01.04.2008

Ultralan Fettsalbe	15 g 30 g	D07AC05	13.03.2008
Vit. A „Agepha“ Tropf.	10 ml	A11CA01	01.04.2008
Volon A Salbe antibiotikahaltig	20 g	D07CB01	01.04.2008

Änderung von Packungsgrößen im Grünen Bereich

Präparat	Menge	ATC-Code
Truxal 15 mg Filmtabl.	50 Stk.	N05AF03

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich

Präparat	Menge	ATC-Code
Lidocorit 2 % Amp. (vormals Lidocorit 2 % Amp. 10 ml)	5 Stk.	C01BB01

Mitteilung der AGES

(Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH):

Änderung von Fach- und Gebrauchsinformationen:

Ciprofloxacin – Risiko einer QT-Verlängerung

Ergänzung in den Abschnitten „besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ und „Nebenwirkungen“. Grund dafür waren Einzelfälle von QT-Verlängerungen, Ventrikuläre Arrhythmien und Torsade de Pointes vor allem bei Risikopatienten.

Cabergolin – Fibrosen und Valvulopathien

Ergänzung in den Abschnitten „Anwendungsgebiete“, „Kontraindikationen“, besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ und „Nebenwirkungen“. Grund war eine Neubewertung der verfügbaren Daten aus publizierter Literatur, klinische Studien und Spontanmeldungen über fibrotische und seröser Entzündungen insbesondere der Herzklappen auf europäischer Ebene. Die Anwendung darf nur unter Ausschluss einer asymptomatischen Herzklappenerkrankung sowie unter sorgfältiger Überwachung von Lungen-, Herz- und Nierenfunktion erfolgen.

Codein – Anwendung während der Stillzeit

Basierend auf einer jüngst publizierten Literaturstelle wurde der Abschnitt „Schwangerschaft und Stillzeit“ überarbeitet. Da der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht, kam es in diesem Zusammenhang zu einer tödlich verlaufenen Nebenwirkung bei einem Säugling. Die Sicherheit der Anwendung ist daher während der Stillzeit nicht gegeben, die Einnahme während dieser Zeit ist kontraindiziert.

HMG-CoA – Reduktase-Hemmer – Interstitielle Lungenerkrankung

Aufgrund von Spontanmeldungen über das Auftreten von interstitiellen Lungenerkrankungen – insbesondere bei Langzeittherapie – kam es auf europäischer Ebene zu einer Neubewertung dieser Substanzgruppe und somit zu einer Aktualisierung im Abschnitt „besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ und „Nebenwirkungen“. Das Auftreten von allfälligen Symptomen, wie Dyspnoe, nicht-produktivem Husten und Verschlechterung des Allgemeinzustandes (Fatigue, Gewichtsverlust, Fieber) ist zu überwachen. Besteht Verdacht auf Entwicklung einer interstitiellen Lungenerkrankung ist die Therapie abzubrechen.

Indikationsänderungen:

Piroxicam – Änderungen in den Anwendungsgebieten

Im Rahmen eines europäischen Verfahrens zur Nutzen-/Risikobewertung der Gruppe der NSAR, wurden die Indikationsgebiete von Piroxicam revidiert. Folgende Indikationen bleiben bestehen: „symptomatische Behandlung von aktivierter Arthrose, rheumatoider Arthritis oder Spondylarthritis ankylopoetica, Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans), juvenile Polyarthritiis“.

Entfallen sind hingegen die Anwendungsgebiete „akute Erkrankungen einschließlich akute Gicht, primäre Dysmenorrhoe, postoperative Schmerzen, Schmerzen nach zahnärztlichen Eingriffen und im Gefolge von Zahninfektionen, Fieber und Schmerzen in Verbindung mit Entzündungen der oberen Atemwege, akute Erkrankungen des Bewegungsapparates (z.B. Bursitis, Tendinitis). Akute posttraumatische Erkrankungen; Radikulalgie“.

Ebenso wurden die Abschnitte „Dosierung, Art und Dauer der Anwendung“, „Gegenanzeigen“ und „besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ überarbeitet.