

*"Die bessere Therapie zum besseren Preis"*

### INHALT

- Themen der Heilmittelökonomie
- Warnhinweise, Nebenwirkungen
- Aktuelle Themen der trägerspezifischen Vertragspartnerinformationen
- Literaturhinweise

Unseren Newsletter finden Sie auch auf der Homepage der  
WGKK (<http://www.wgkk.at>);  
NÖGKK (<http://www.noegkk.at>);  
OÖGKK (<http://www.ooegkk.at>);  
STGKK (<http://www.stgkk.at>);  
BGKK (<http://www.bgkk.at>);  
SGKK (<http://www.sgkk.at>);  
KGKK (<http://www.kgkk.at>);

#### Impressum:

##### Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:

##### Alleiniger Medieninhaber (Verleger):

Burgenländische Gebietskrankenkasse,  
Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt,  
vertreten durch ihre gesetzlichen  
bzw. satzungsmäßigen Organe

##### Erklärung über die grundlegende Richtung:

Fach- und Informationsblatt für  
Interessierte an der Arbeit der  
Argumentationsgruppe Heilmittel

##### Herausgeber:

Burgenländische Gebietskrankenkasse  
Für den Inhalt verantwortlich: DI Berthold  
Reichardt, [berthold.reichardt@bgkk.at](mailto:berthold.reichardt@bgkk.at),  
Tel.: 02682/608-1405

##### Grafische Konzeption, Satz und Layout:

Steiermärkische Gebietskrankenkasse,  
Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz

### THEMEN DER HEILMITTELÖKONOMIE

#### Hohe Kostenreduktionspotenziale bei Lipidsenkern

##### Atorvastatin

Ca. € 3,-- beträgt der Preisvorteil vieler Generika gegenüber Sortis 20 mg und Sortis 40 mg und über 50.000 Packungen wurden von Letzteren im Jänner 2017 mit den SV-Trägern abgerechnet.

##### Rosuvastatin

13 Rosuvastatin-Generika sind im April 2018 im Roten Bereich gelistet, mit einem Preisvorteil von bis zu 87 % gegenüber Crestor. Ein Einsparpotenzial von > € 1 Mio. pro Monat ist mit der Implementierung in den Grünen Bereich des EKO verbunden.

#### Investition in Innovation

Allein im Jänner 2018 wurden zusätzlich € 5,8 Mio. = +42 % für Palbociclib (Ibrance), Lenalidomid (Revlimid), Apixaban (Eliquis), Edoxaban (Lixiana) und Adalimumab (Humira) aufgewendet, so dass deren Monatsumsatz € 19,6 Mio. beträgt.

### WARNHINWEISE, NEBENWIRKUNGEN

#### Esmya 5 mg (Ulipristalacetat)

[https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx\\_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=c4792b6c3c40ee8ff6338854546e4f07a454f5f6&file=fileadmin/user\\_upload/180221\\_Esmya.pdf](https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=c4792b6c3c40ee8ff6338854546e4f07a454f5f6&file=fileadmin/user_upload/180221_Esmya.pdf)

(Zugang am 27.2.2018)

Einschränkungen der Anwendung: keine Neueinstellungen, kein neues Therapieintervall, Leberfunktionstests bei allen Patientinnen (auch nach Therapieende)

## LITERATURHINWEISE

### Evolocumab for Treatment of High Cholesterol: Effectiveness and Value

Institute for Clinical and Economic Review, 2017  
[https://icer-review.org/wp-content/uploads/2017/06/ICER\\_PCSK9\\_NEU\\_091117.pdf](https://icer-review.org/wp-content/uploads/2017/06/ICER_PCSK9_NEU_091117.pdf)

(Zugang am 27.2.2018)  
 Kritisches HTA zu Evolocumab: Die Kosteneffektivität ist bei den angeführten Therapie-kosten nicht gegeben.

### DEGAM Leitlinie Multimorbidität

[http://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047%20Multimorbiditaet/053-047I\\_%20Multimorbiditaet\\_redakt\\_24-1-18.pdf](http://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/DEGAM-S3-Leitlinien/053-047%20Multimorbiditaet/053-047I_%20Multimorbiditaet_redakt_24-1-18.pdf)

(Zugang am 27.2.2018)

„Die Ziele dieser Leitlinie sind

- die vorhandene Evidenz zur primärärztlichen Versorgung multimorbider Patienten zusammenzutragen und sie in hausärztlich relevante Empfehlungen umzusetzen;
- einen „Meta-Algorithmus“ anzubieten, der eine Strukturierung der Konsultation und die Priorisierung von Problemen ermöglicht und dadurch dem „Überwältigtsein“ von der Komplexität und Vielfalt der Problemlagen entgegen zu wirken;
- die Patientenperspektive in den Mittelpunkt der Entscheidungsprozesse zu stellen; eine über den Beratungsanlass hinausgehende strukturierte Vorgehensweise vorzuschlagen.“

### Comparison of Five Major Guidelines for Statin Use in Primary Prevention in a Contemporary General Population

Ann Intern Med. 2018 Jan 16;168(2):85-92  
 In Abhängigkeit von der Leitlinie, US-amerikanisch, kanadisch, britisch oder gesamt-europäisch, kommen zwischen 15% und 44% der 40- bis 75-Jährigen für eine Statintherapie zur Primärprävention in Frage.

### Global surveillance of trends in cancer survival 2000–14 (CONCORD-3): analysis of individual records for 37 513 025 patients diagnosed with one of 18 cancers from 322 population-based registries in 71 countries

Lancet 2018 Jan 30  
 Internationaler Vergleich zu den Überlebensraten inkl. österreichischer Daten.

### State of Health in the EU, Österreich, Länderprofil Gesundheit 2017

[https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp\\_at\\_german.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_at_german.pdf)  
 (Zugang am 27.2.2018)

<https://www.oecd.org/els/health-systems/Country-Health-Profiles-2017-AUSTRIA-Media-Briefing.pdf>  
 (Zugang am 27.2.2018)

- Österreicher leben länger im Vergleich zu anderen EU Einwohnern, verbringen aber weniger dieser Jahre in guter Gesundheit.

### Ocaliva (Obeticholsäure)

[https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx\\_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=a0f6e40d8ab5f2c27ee672e85dca7a0ca1c16273&file=fileadmin/user\\_upload/180212\\_Ocaliva.pdf](https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=a0f6e40d8ab5f2c27ee672e85dca7a0ca1c16273&file=fileadmin/user_upload/180212_Ocaliva.pdf)

(Zugang am 27.2.2018)

Risiko für schwere Leberschäden

### Litak (Cladribin)

[https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx\\_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=3d4fdb8c85d47f47648921796f09b35c92557fa8&file=fileadmin/user\\_upload/171218\\_Litak.pdf](https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=3d4fdb8c85d47f47648921796f09b35c92557fa8&file=fileadmin/user_upload/171218_Litak.pdf)

(Zugang am 27.2.2018)

Risiko einer progressiven multifokalen Leukenzephalopathie (PML) unter Cladribin (Litak)

### Convulex, Depakine (Valproat)

[http://www.ema.europa.eu/docs/en\\_GB/document\\_library/Referrals\\_document/Valproate\\_2017\\_31/Recommendation\\_provided\\_by\\_Pharmacovigilance\\_Risk\\_Assessment\\_Committee/WC500243552.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Valproate_2017_31/Recommendation_provided_by_Pharmacovigilance_Risk_Assessment_Committee/WC500243552.pdf)

(Zugang am 27.2.2018)

Neue Vorgaben der Zulassungsbehörde sollen verhindern, dass Schwangere mit Valproat therapiert werden.

Altersverteilung von Patientinnen mit Valproat im 1. Halbjahr 2017 in Österreich:

Alter	Patientinnen
bis 19 Jahre	744
20 - 39 Jahre	1.436
40 - 59 Jahre	3.632
60 - 79 Jahre	1.418
ab 80 Jahre	508

### Zinbryta (Daclizumab beta)

[https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx\\_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=e3a8ffd833d311518df47c5b6101d5d0a4c1de86&file=fileadmin/user\\_upload/180315\\_Zinbryta.pdf](https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=0&hash=e3a8ffd833d311518df47c5b6101d5d0a4c1de86&file=fileadmin/user_upload/180315_Zinbryta.pdf)

(Zugang am 5.4.2018)

Die Zulassung für Zinbryta (Daclizumab) in der Europäischen Union ist ruhend gestellt.

- Tabak- und Alkoholkonsum bleiben hoch, sind bei Jugendlichen aber rückläufig. Vergleichsweise geringe, aber steigende, Fettleibigkeitsraten.
- Das Gesundheitssystem ist relativ teuer, fragmentiert und hat einen starken Fokus auf die stationäre Versorgung in Krankenhäusern.
- Relative geringe vermeidbare Sterblichkeit legt gute Leistung bei Akutversorgung nahe. Verbesserungspotenzial bei Primärversorgung.
- Guter Zugang zur Gesundheitsversorgung und umfassender finanzieller Schutz für die Bevölkerung.
- Zunehmender Ausgabendruck. Raum für Effizienzsteigerungen durch Stärkung der ambulanten Versorgung

**Use of biological disease modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis in Austria from 2008 to 2011 : A retrospective analysis of 72% of the population**  
Wien Klin Wochenschr. 2018 Feb 14  
Eine „eigene“ Publikation zur Versorgungsepidemiologie der RA mit Biologika.

**Österreichischer Diabetesbericht 2017**  
<https://jasmin.goeg.at/327/1/diabetesbericht2017.pdf>  
(Zugang am 27.2.2018)

**Österreichischer Gesundheitsbericht 2016**  
<https://jasmin.goeg.at/328/1/gesundheitsbericht2016.pdf>  
(Zugang am 27.2.2018)

**The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation**  
Europace. 2018 Mar 19 und  
European Heart Journal (2018) 00, 1–64  
<https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euy054/4939499>  
(Zugang am 5.4.2018)  
<https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehy136/4942493>  
(Zugang am 5.4.2018)  
Die Empfehlungen zur Therapie des Vorhofflimmerns wurden in vielen Bereichen aktualisiert/adaptiert/verändert, von der Indikation über die Wechselwirkungen bis zu den Absetzkriterien. Die zitierte Langversion der europäischen Leitlinie ist jedenfalls lesenswert.

## **Xofigo (Radiumchlorid) in Kombination mit Abirateron Acetat + Prednisolon/Prednison**

[https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx\\_nawsecured1&u=0&g=0&t=0&hash=adc5408901d7a65acf8f7baa1799956951659b30&file=fileadmin/user\\_upload/180326\\_Xofigo.pdf](https://www.basg.gv.at/index.php?eID=tx_nawsecured1&u=0&g=0&t=0&hash=adc5408901d7a65acf8f7baa1799956951659b30&file=fileadmin/user_upload/180326_Xofigo.pdf)

(Zugang am 5.4.2018)

Xofigo ist nun in der Kombination mit Abirateron Acetat + Prednison/Prednisolon kontraindiziert.

## **AKTUELLE THEMEN DER TRÄGERSPEZIFISCHEN VERTRAGSPARTNERINFORMATIONEN**

### **Diabetisches Fußsyndrom und Amputationen – gibt es aktuelle Zahlen?**

Österreichische Amputationsdaten 2012-2016 und Konnex zu Diabetes

### **Rechtliche Änderungen am österreichischen Arzneimittelmarkt**

Info zu Preisabschlägen, der Preiskommission und dem Preisband

### **Streichung von Subutex (Wirkstoff Buprenorphin) aus dem EKO**

Wegen Unwirtschaftlichkeit nicht mehr auf Kassenkosten verschreibbar.

### **Cave Risiko von Therapieversagen: Dasatinib (Sprycel), Erlotinib (Tarceva) und Pazopanib (Votrient) bei gleichzeitiger Anwendung von PPI**

Mit Daten der Realversorgung

### **Olmesartan-assoziierte Enteropathie**

Hintergrund des Streichungsverfahrens der Olmesartan-Präparate

**Unser Leitsatz:  
Die bessere Therapie  
zum besseren Preis**